却病瑣言

吳江潘緯亮甫遺著　許盟孚錄

我鄉潘亮甫先生。爲清道咸間名士。家貧。工詩文。醫名轉爲所掩。所著有却病瑣言一卷。採擇諸子百家之說。又參以先生之閱歷及體驗之簡易可行者。條分治性、衛體、慎欲、養疴、寢興、居處、飲食、衣服、道引、九門。日用動靜。雖似平淡無奇。而自有實理。讀者幸毋玩忽視之。　盟孚附識

治性

人有一團太和之氣。則邪癘不能入。有一片誠敬之心。則物欲不能侵。和者樂之原。敬者禮之本。古之君子。禮樂不可斯須去身。職是故也。齋居寂處時如是。應事接物時亦如是。人不可無暇。有暇則邪念得乘之而入。逸則思淫。古有箴誡。善用暇者。莫如看書。經史百家之外。如古人詩話、尺牘、書畫譜、名人法帖。以及稗官野史。與凡時令、修養、農圃、種植、等書。皆可備閱。憤懣之時閱之。可以和氣而平心。暇逸之時閱之。可以怡神而適志。惟談論神怪及閨闥等書。斷斷不可看。養靜爲攝生首務。五官之司。俱屬陽火。精髓血脈則陰精也。陰足乃克濟陽。陰不足而受陽制。立見枯竭矣。故養靜即所以養陰。

痢疾之救星

痢疾一症。其致病之原。大都由於臟腑傳化失職。寒熱之邪侵乘。食滯之氣。停阻。以致腹痛如絞。奔追下痢。晝夜無度。痛苦萬分。國醫張伯照先生有鑒於斯。特本其學識經驗之所得。發明「痢疾藥水」一種。專治紅白痢疾。噤口不爽。裏急後重。腹痛脘悶等證。無不立見其效。用二瓶。輕者一瓶。重者溫開水冲服。孕婦勿忌。張醫士爲普及起見。特委托本局經售。凡抱病者。請速購買試服。方知其功效之迅速也。

價目　每瓶售大洋一角　每十二瓶售大洋一元

發行所　上海寗波路老閘捕房對面雲南路口鏞壽里一一六號　中國醫藥書局

雜病徵答

同人等限於見聞。對於疑難雜病。無法解答。茲特分期披露。徵求海內同道賜答。實爲公便。

（三）曾君典君問（湖南鳳凰縣楠木埠朱覺五收轉）

上氣喘逆、呼吸抽急不順、牽引胃脘作脹、按之微痛、但較不按稍好、發作時、以夜十時起、天明始止、依息不能臥、汗出如雨、晚間尤甚、心悸、咳嗽、左半身稍覺麻木、日間狀如平人、飲食爲常、無他疾苦、現服藥方、稍覺好、但實際、並無痊可之機、間或一發作、仍然如病劇時、無少異、醫曾三更現以寧心安神除汗驅寒方主治現服藥方列後

結雲苓四錢　杭寸冬三錢　牡蠣三錢　野于朮二錢　杭白芍三錢　明片一錢　炙甘草　柏子仁二錢

黃芪三錢　酸棗仁三錢　北五味一錢五　吳萸一錢　油當歸二錢　法下二錢　浮小麥三錢

現服藥方之醫者。已開方十次。最先只用五六味藥、概係最後藥方所列各藥品。但分量比較多耳、又病者氣喘痛時、以牛黃合拌鴉片、吸數口、略可止息痛苦、

（四）陳吳氏問（本埠大碼頭元裕承油蔴號陳狄章收）

本年三月十二號起患咳嗽後覺喉痛起出紅刺刺上白點爛開左右二條在喉管間下處相連處長一寸寬二分相連處寬三分左右吃鹹食品不覺痛惟吃甜物則疼痛請黃冕峯喉科診視據云爛喉痧遂付吹藥服煎藥因體虛弱打賜保命注射繼起重瘧疾腐處覺稍寬刻下瘧疾已愈迄已數月腐處仍覺無變動

診例

本報主筆

楊志一醫士

朱振聲醫士

（甲）特號二元
（乙）門診一元
（丙）出診四元
（丁）膏丸方四元
（戊）急病隨請隨到

隨到隨診　貧病減半　路遠遞加　次日取件

時間　門診上午九時至下午四時止　出診四時以後

診所　上海雲南路會樂里第一弄第一家

電話六三四九三

掛號處啟

幸福報

紹儀署

第二五六期

（民國十九年九月十八日）

每份售二分

（館址上海三馬路雲南路口）

定報價目　每三日出一張。五個月一元。全年二元。寄費在內。本外埠一律。國外倍加。郵票代現九五計值

廣告價目　每期每格（共計五方寸）五元均排於新聞之旁佩嵌入新聞中長期面議

本期要目

△童男處女之測驗法
△瘧疾初起應注意兩點
△經驗良方
△頸癧治療法
△疫之研究
△外科自療學
△傷寒症之調理
△却病瑣言
△雜病徵答

愛情障礙

愛香惡臭：人之恆情。鼻流濁涕：腥臭異常。愛情破產：理所必然。挽救之策：其惟保腦。程君青心爲本埠著名之小說家。平日用腦過度。致患腦漏。終日流涕。其夫人惜春。深痛惡之。結婚未久。愛情破產。程君心竊憂之。遍求中西名醫。均無效驗。後無意中在友人處見幸福報上載有保腦丸可治腦漏。購服二盒。試之果效。不數日而宿疾頓愈。夫妻愛好如初云。

保腦丸專治腦漏有意想不到之效每盒大洋五角不折不扣

童男處女之測驗法

（符月江）

閱幸福報第五集第三期內。六月廿一載答馬善徵君問辨別處女一則。朱涼月君答檢驗喉管。最爲確當。所云圍線一根。測其長短。但頸項之大小。無一定之準則。一女當前。何法可知其合度與已長出本來位置乎。今有一立時可試驗之法。無論男女。凡未經交媾者。其頸項周圍之大小。經用線圍準其頸。執其圍合之兩端。對折成半根。遂以此半根之一端。撳於耳門。再以一端放至鼻尖。長短一定適巧。如要超過鼻尖三四分。或竟有至寸餘者。其必曾經滄海也無疑。此法余先聞諸一老嫗。嗣測驗已婚未婚男女多人。毫髮不爽。讀者可先以自己試之。

瘧疾初起應注意兩點
(秦丙乙)

瘧疾初起，最宜注意者、厥有二點、因舉之以實本報、

(一)翕翕發熱、淅淅惡寒。或偶作於淩晨。或間見乎日晡、此固無所謂瘧疾、亦決不得遽執爲瘧疾、更萬不能治之以瘧疾之道也、乃不明病家、遽誤認爲瘧、而粗心醫家、竟卽以瘧治、此不瘧亦瘧矣、大概初起類瘧、非少陽之邪、乃肺胃之邪、但須以尋常感冒治之、佐以理溼化痰足矣、割鷄之力、焉用牛刀爲哉、

(二)瘧疾初起、世人好以金鷄納霜截之、殊不知初起發不數次、邪未清楚、而勉強截止、金鷄納霜性質慓悍、富於截瘧之功。能一服之後。立奏奇功、而邪遏於內、待時蠢動、無形之禍害、已種因於此矣、是必四五發之後、正體漸虧、蘊邪漸清、始參以少許金鷄納霜、依量照服、則一鼓成擒、永無還患也、往往服之過早、逾時復發、纏綿不治者屢矣、是金鷄納之殺人也、亦人之不善用金鷄納霜也、

經驗良方

治小腸氣法

以陳壁土炙於火爐。(或爆於烈日下)及熱。以布包之。用熏陰囊。冷則更熱而熏。如此數次。連熏數日而愈。且能斷根。又方。用打碎之生鵝蛋。置於銅器中。而以秤錘於火爐中燒紅先浸以醋。再置於銅器中。將鵝蛋收上。及冷後。剁下。於睡眠前食之。立愈。

小兒黃水瘡

小兒頂上、生瘡俗呼黃水瘡。以凡士林擦之。然易污枕褥。不若於煮飯時。將沸於鍋蓋上之米沫擦之。尤爲神速清淨。嘴角生瘡。俗名剪口瘡者。用之亦效。

治喉蛾奇效方

喉蛾者喉間腫痛。狀如蠶蛾患在一旁者爲單蛾。二旁者爲雙蛾。單蛾病輕。雙蛾病重。甚至勻水難下。痰壅氣急。治稍緩。卽致斃命。實爲最危險之症也。余有一法。初起之時可用食鹽搓手心。鹽乾復易新鹽。不逾半時。卽可愈矣。若已重者。可用斷燈心數莖。縛于病人之指甲。就火薰灼。俟焦黃。再以臭蟲放瓦上炙焦。共研細末。向患處吹之。頗有奇效。

立止鼻血法

鼻中出血。最易傷身。治法雖多。然亦有驗有不驗。茲得一最妙之法。收效甚速。其法以火紙一張。搓成一捲。用火燃着。倒插於竹管內。約十秒鐘時。俟熄。連灰塞於出血之鼻內卽愈。

頸瘻治療法
(續)　(李健頤)

病理頸項兩旁筋脈交遣、經血稽留不去、再加蟲蝕、則新血不生、新血不生、凝滯爲瘀、瘀血變化、阻礙營衛之循行、外之衛氣、不能與內之營血、互相聯絡、瘀毒獨得猖狂、陷入脈管、留連於肉腠之間、卽成爲瘻、素問生氣通天論曰『陷脈爲瘻、留連內腠、』

症狀初起頸項腫痛、肉裏發生大核、如瘰癧之狀、高如破榴、痛徹心肺、寸關弦急、口燥舌黃、

診斷此症宜急治、卽可扼阻毒勢之蔓延、否則危險堪虞、

療法治宜解毒散瘀、開鬱消瘻爲主、可用當歸白芍花粉茯苓皮浙貝蒲公英夏枯草忍冬藤桔梗柴胡沒藥乳香海藻昆布鬱金甘草等、外敷宜麻黃浙貝南星青黛生半夏大黃南香等研末調猪胆汁搗塗最效、

驚駭治療法

定義有觸而心動爲驚、驚之甚者爲駭、

原因卒聞巨響、或目擊異物、或遇險臨危、致心血大虛陡然搖動、乃起反射作用、而傳于腦、卽發驚駭、

病理驚駭一症、雖然是由於腦之動搖、推其原因、實由於心血大虛、心血之虛是由于經命之氣化虛弱、外遇內薄以致也、夫經命之氣旺盛、則心血充郭、雖有危異之感、不能搖也、否則、外有所觸、卽傳入內、而干及於藏神之心臟、心血一動傳達於腦、而發驚駭、素問生氣通天論曰、『命氣化薄、傳爲善畏、及驚駭、』然則驚駭一症、顯然由心病之波及於腦之爲病也、(未完)

本報主筆

張少波醫家

診例

科目	診金	時間	診所
內科	門診一元	上午門診	滬西武定路祥興里
外科	出診四元	下午出診	
女科			
喉科			

疫之研究
(易上達)

疫者天地之厲氣也。從疒從殳如殳之殺人也。在歲有多寡。在方隅有厚薄。在四時有盛衰。觸之則病。寒之傷人也。首入足太陽經。熱之中人也。先入手太陰經。此疫氣之傷人。則多中半表半裏之際。故初中疫者。多發熱惡寒嘔吐泄瀉。甚則目眩耳閉。不省人事等。皆半表半裏之現像也。若陰虛體者。漸次化熱。熱淫之氣。浮越某經。則現某經之熱症。如口渴咽乾。時飲冷水。氣噴似火。身如炭灼。或見麻疹瘖斑痧子等。皆血不足以勝疫。疫與血搏而作故也。陽虛者漸次化寒。故凜凜惡寒頭痛身痛。四肢厥逆。甚則胸腹痛痕。四肢青脹。皆氣不足以勝疫。疫與氣搏而作故也。在初起時。祗宜和解。不可妄施汗吐下。若陰虛化熱者。用清舉兩解。清者清其熱。舉者舉其斑。陽虛化寒。用溫升兩解。溫者溫其臟府。升者升疫化汗而出也。

外科自學療
(姚夢石)

麥冬湯——治肺虛有熱、胃有濕痰、南沙參麥冬川貝法半夏橘紅蔞皮茯苓海蛤粉生苡仁竹茹

補肺清金散——治鷄胸龜背、脈虛數、身熱少食者、沙參懷山藥麥冬甜杏仁橘紅川斛蔞皮象貝茯苓毛燕蓮子

金水平調散——治鷄胸龜背，內無痰熱、脚弱不能站立、沙參麥冬懷藥懷牛膝當歸女貞旱蓮草茯苓黑料豆玉竹毛燕桑寄生紅棗

龜背一證、蓋以形名病也、且患者多屬幼孩、其歲齡、大概一歲至十五、始起、都不甚覺察、雖微有腰痛、而視之無形、外無寒熱、內無泄瀉等症狀、胃納、時減時增、故每不注意及之、輕則舉動疏懶、重則啼哭無休、不久脊背高凸、此腎痺也、當日夜激痛之際。卽投龜版鱉甲杜仲續斷茯苓陳皮獨活白芍秦艽萆薢牛膝之類或痛後病勢復甯，惟間有欬嗽。兩足不能行步、背脊隆起、形若癰瘡、是瘋是痰、當細辨別、在有膿無膿耳、酌量用藥、不可輕施刀圭、爲無膿者觸活寄生湯加鱉甲龜版、食服加南查肉生穀芽、病勢垂危者宜用四君加蛤粉川貝龍骨牡蠣天冬麥冬鱉甲龜版

按此症都由先天不足、風寒濕三氣、盤踞經絡、西醫名曰佝僂病、謂脊中缺少石灰質、治療多不效、在初起時中醫用滋腎通經絡藥、輒奏奇驗、

傷寒症之調理
(衛生教育會)

傷寒爲症甚險。且併發症甚多。危險尤甚。傷寒發熱。常症大約三星期。併發症在三星期內。隨時可以發生。在第三星期中最爲危險。然在熱度退後。猶須小心謹愼。蓋其反復甚易。且易牽動他部也。第一須服從醫生。苟一不愼。悔之何及。調養得宜而復原。固自不少耳。在調養痊復期內。有二種危險(一)起床太早。往往身熱已退之後。便自謂平安無事。急於起床。或復工作。以致受損而復發。危殆萬分。(二)飲食不愼。病時不能進食。身熱一退。食慾大增。便思飮食。且思及各種強烈之物。且非立卽進納不可。惜乎此時病人不能自見其腸內狀況。當知此時發炎雖減。瘡痛未改。肌柔膜嫩。苟隨病人之欲。(未完)